


Informacje o zabiegu immunoterapii



Wkrótce zostanie zastosowana u Ciebie immunoterapia. Prawdopodobnie widzialesz w szpitalu film o tego rodzaju leczeniu, o tym, w jaki sposób działa i jakie skutki uboczne może powodować. Jeśli chciałbyś zobaczyć ten film ponownie? Kliknij link lub zeskanuj kod:

<https://youtu.be/o80WMioOlcA>



Immunoterapia

Immunoterapia to leczenie polegające na pobudzeniu systemu odpornościowego pacjenta. Dzięki temu możliwe jest jeszcze lepsze rozpoznawanie i niszczenie komórek nowotworowych. Podobnie jak inne leki, immunoterapia czasami ma skutki uboczne. Ponieważ leczenie działa w całym ciele, może powodować skutki uboczne w całym organizmie.

Możliwe działania uboczne:



1) Toaleta:
ból brzucha, biegunka, luźne lub śliskie stolce, krew w stolcu.



Mocz:
częstsze lub rzadsze oddawanie moczu. Zmieniony kolor moczu



2) Oddychanie:
ból gardła, kaszel lub trudności w oddychaniu



3) Skóra:
swędzenie, zaczerwienienie, pęcherze lub łuszczące się płyty skóry



4) Waga:
zmiana wagi



5) Sprawność fizyczna:
uczucie zmęczenia lub senność



6) Apetyt/pragnienie:
zmniejszony apetyt, nudności, silne pragnienie



7) Serce:
kołatanie serca, ból w klatce piersiowej



8) Oczy:
pogorszenie widzenia, niewyraźne lub podwójne widzenie, zażółcenie białek oczu, zaczerwienione, bolesne oczy



9) Gorączka:
temperatura (powyżej 38,5 stopni Celsjusza)



10) Ból:
ból mięśni/stawów, osłabienie lub sztywność mięśni, ból brzucha, ból głowy




11) Uczucia:
depresja, drażliwość, silne zmęczenie

Informacje o zabiegu immunoterapii

Możesz także doświadczyć innych dolegliwości. Ważne jest, aby zgłaszać działania niepożądane lekarzowi lub pielęgniarce. Konsultując się z lekarzem na bieżąco, możesz zapobiec pogorszeniu się skutków ubocznych, a także zdecydować o wcześniejszym przerwaniu leczenia z powodu tych dolegliwości.



Podczas immunoterapii nie musisz podejmować żadnych specjalnych środków higieny. Możesz nadal korzystać z tej samej toalety co członkowie Twojej rodziny, przytulać dzieci i wnuki lub uprawiać seks.



Ważne jest, aby zapobiegać ciąży, ponieważ może dojść do uszkodzenia płodu. W razie potrzeby należy stosować antykoncepcję do pięciu miesięcy po ostatnim zabiegu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Dane kontaktowe szpitala:

Nazwisko pielęgniarki / opiekuna:

Numer telefonu:

Numer telefonu W NAGŁYCH PRZYPADKACH (poza godzinami pracy):

Informacje dodatkowe:

.....
.....
.....
.....