


# Bağışıklık terapisi hakkında bilgi



Yakında bağışıklık terapisi alacaksınız. Hastanede muhtemelen terapi, nasıl etki göstereceği ve ne tür yan etkilerin ortaya çıkabileceği hakkında bir film izlemiş olmalısınız.

Bu filmi tekrar izlemek ister misiniz? Öyleyse göz atın:

<https://youtu.be/ve-vIXHkuuc>



## Bağışıklık terapisi (İmmünoterapi)

Bağışıklık terapisi (İmmünoterapi), bağışıklık sisteminizin daha etkin hale gelmesini sağlayan ilaçlı bir tedavidir. Ubu sayede bağışıklık sisteminiz kanserli hücreleri daha kolay algılayıp yok edebilir. Tıpkı diğer ilaçlar gibi, bağışıklık terapisinin de bazen yan etkileri olur.

Bağışıklık terapisi tüm vücuda yayıldığından dolayı, vücudunuzun herhangi bir yerinde yan etkilere yol açabilir.

### Olası yan etkiler şunlardır:

- 1) Tuvalet:** karın ağrısı, ishal, gevşek veya sümüksü dışkı, dışkıda kan  

- 2) Solunum:** boğaz ağrısı, öksürük ve solunumda güçlük  

- 3) Cilt:** kaşıntı, ciltte kızarıklık, kabarcıklar veya pullanma  

- 4) Kilo:** kiloda değişiklik  

- 5) Zindelik:** yorgunluk, kendini sersem gibi hissetme  

- 6) İştah/sıvı gereksinimi** iştahta azalma, mide bulantısı, fazla susuzluk  

- 7) Kalp:** kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı  

- 8) Gözler:** görmede kötüleşme, bulanık veya çift görme, göz akında sararma, gözlerde kızarıklık ve ağrı  

- 9) Ateş** vücut sıcaklığı (38,5 dereceden fazla)  

- 10) Ağrı:** adale/eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü ya da sertliği, karın ağrısı, baş ağrısı  

- 11) Ruh hali:** depresyon, sinirlilik, şiddetli yorgunluk  


# Bağışıklık terapisi hakkında bilgi

Başka şikayetleriniz de olabilir. Yaşadığınız yan etkileri doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir. Tedavinizi uygulayan kişiye zamanında danışmak, yaşadığınız yan etkinin kötüleşmesinin önüne geçebilir. Bu sayede yan etkiler nedeniyle tedavinin zamanından önce durdurulmasını da önleyebilirsiniz.



Ik heb last van..




verpleegkundige of



behandelend arts



Bağışıklık terapisi sırasında, hijyenle ilgili özel önlemler almanız gerekmez. Ailenizin diğer fertleriyle, çocuklarınızla (ve torunlarınızla) aynı tuvaleti kullanmaya, onlara sarılmaya ve partnerinizle yakınlaşmaya hiçbir şey olmamış gibi, devam edebilirsiniz.



Öte yandan, doğmamış çocuğun zarar görmesi olasılığına bağlı olarak hamileliğin önlenmesi önemlidir. Gerekirse, ilacın son verilışinden sonra en fazla beş ay boyunca doğum kontrol yöntemlerinden yararlanın.

## Daha fazla bilgi için:

Hastanenin iletişim bilgileri:

Hemşire/vaka yöneticisinin soyadı:

Telefon:

ACİL durumlar için telefon numarası (ofis saatleri dışında):

## Ek bilgi:

.....

.....

.....

.....